

phẩm Bidamin) Phun với nồng độ 0,03% (0,64 kg Bidamin hòa với 320 lít nước để phun cho 1 ha) phun vào thời điểm sau khi ra hoa rộ, lạc đã đâm tia có tác dụng giúp cho lạc hạn chế sinh trưởng, tăng cường vận chuyển cho quả và đảm bảo thời gian sinh trưởng của giống.

6. Chăm sóc và tưới nước

- Khi cây có từ 2 lá thật trở lên, tiến hành tỉa cây đúng mật độ quy định.

- Khi cây có từ 3 - 4 lá thật, xới nông đều khắp mặt luống, đồng thời tiến hành bón thúc cho lạc

- Khi cây có 6 - 7 lá thật (sắp ra hoa) xới gốc sâu 3- 5 cm, để làm sạch cỏ dại và tạo điều kiện gốc thoáng để đâm tia, nhưng chú ý không vun đất vào gốc.

- Khi lạc ra hoa 10 – 15 ngày, xới và vun nhẹ quanh gốc.

Nếu gặp trời mưa hoặc tưới nước bị ngập tràn, đất bị đóng váng thì xới nhẹ phá váng để thông thoáng.

7. Phòng trừ cỏ dại và sâu bệnh

Cỏ dại: dùng thuốc Dual theo đúng liều lượng hướng dẫn để phòng trừ cỏ dại trước gieo trồng và sau khi làm đất.

Sâu hại: sâu xám, sâu xanh, sâu khoang... thường hại ở giai đoạn đầu của cây lạc và sâu đục quả ở giai đoạn tạo quả. Dùng thuốc Padan 95, Fastas, Basudin... để phòng trừ.

Bệnh hại: gỉ sắt, đốm lá, lở cổ rễ, héo rũ. Dùng thuốc Ridomil, Bavistin, Vicarben C, Aliette 800WG... để phòng trừ.

8. Thu hoạch và bảo quản

Chọn ngày nắng ráo để thu hoạch, thu hoạch khi quả chín khoảng 80 – 85% số quả trên cây. Sau khi nhổ, vặt quả, rửa sạch, phơi dưới nắng nhẹ đến khi vỏ lụa tróc là được.

Chú ý: phơi lạc giống nhất thiết phải phơi trên nong nia, sân đất (không phơi trực tiếp trên sân gạch, xi măng. Khi phơi khô phải để nguội rồi sau đó mới cho vào bao nilon hoặc chum vại đậy kín, bảo quản nơi khô mát, tránh tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng bên ngoài.



VIỆN KHOA HỌC KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP
DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ



DỰ ÁN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ
NÔNG NGHIỆP - 2283-VIE(SF)



**QUY TRÌNH TRỒNG LẠC VỤ THU ĐÔNG TRÊN ĐẤT GÒ ĐỒI
VÙNG DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ**

Kính chúc bà con có những vụ mùa bội thu

Địa chỉ : Đường Tây Sơn, KV.8, P. Nhơn Phú, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Điện thoại: (056). 3846626; (056). 3735247; Fax: (056). 364617

Vùng Duyên hải Nam Trung bộ gồm các tỉnh thành từ Đà Nẵng đến Bình Thuận. Diện tích gieo trồng lạc gần 40.000 ha; trong đó gần 80% diện tích này được sản xuất ở vụ đông xuân. Tuy nhiên, việc không lưu trữ được giống lạc từ vụ hè thu của năm trước cho đến vụ đông xuân năm sau, làm mất chủ động về nguồn giống lạc để phục vụ đông xuân (vụ trồng lạc chính trong năm); cho nên lạc thương phẩm vừa thu hoạch từ vụ 2 của Tây Nguyên được chuyển thành lạc giống cho Vùng Duyên hải Nam Trung bộ với giá rất cao (có những thời điểm giá được nâng lên từ 30.000 - 35.000 đồng/kg) và cũng chính vì không chủ động được nguồn giống có tiềm năng năng suất cao, phẩm chất tốt nên năng suất lạc bình quân của vùng chỉ đạt 20,0 - 25,0 tạ/ha.

Do đó, thực hiện quy trình kỹ thuật trồng lạc vụ thu đông trên đất gò đồi ở Vùng Duyên hải Nam Trung bộ là rất cần thiết.

1. Chọn đất trồng lạc

Trồng lạc ở vụ thu đông của vùng Duyên hải Nam Trung bộ nên chọn đất gò đồi, chủ động nước tưới ở đầu vụ và tiêu thoát nước trong mùa mưa.

Đất được cày bừa kỹ, lên luống rộng từ 1,4 – 1,5 m. Rạch rãnh sâu từ 0,25 – 0,3 m.

Sau khi làm đất và bón lót, cần phun thuốc phòng trừ bệnh héo rũ do nấm gây ra bằng một số loại thuốc như: Champion, Bavistin, Aliette 800WG, Monceren 250SC...

2. Thời vụ gieo trồng

Từ ngày 5 đến ngày 10 tháng 8

3. Giống sử dụng

Giống lạc L14 hoặc L23.

Giống lạc L14 được Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển đậu đỗ - Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm chọn lọc theo phương pháp chọn lọc quần thể từ dòng lạc QĐ5 từ tập đoàn lạc nhập nội của Trung Quốc.

Giống được công nhận chính thức là giống TBKT theo Quyết định số 5310/BN- KHKT ngày 29 tháng 11 năm 2002.

Giống lạc L23 được Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển đậu đỗ-Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm chọn ra từ nguồn thu thập năm 2001. L23 được công nhận cho sản xuất thử năm 2008 theo Quyết định số 111/QĐ-TT-CCN ngày 03 tháng 6 năm 2008

Đây là 2 giống lạc đạt năng suất thực thu cao nhất trong thí nghiệm Nghiên cứu tuyển chọn giống lạc triển vọng trong điều kiện thời tiết vụ thu đông trên đất gò đồi vùng Duyên hải Nam Trung bộ

4. Mật độ gieo trồng

Sử dụng mật độ và khoảng cách gieo hạt: 30 cm x 10 cm x 2 hạt/hốc và bố trí 4 hàng lạc/luống.

Độ sâu khi lấp hạt: 2 – 3cm (đất khô thì lấp sâu, đất ẩm thì lấp nông hơn).

5. Phân bón và hoạt chất điều hòa sinh trưởng

Đối với đất xám bạc màu, sử dụng mức bón/ha: 5 tấn phân chuồng + 500 kg vôi và 45kg N + 90kg P2O5 + 60kg K2O

Đối với đất feralit trên đồi, sử dụng mức bón/ha: 5 tấn phân chuồng + 500 kg vôi và 30kg N + 90kg P2O5 + 60kg K2O

Cách bón: Bón lót toàn bộ phân chuồng, Lân và ½ lượng vôi bột

Bón thúc: thúc lần 1 (sau khi gieo 10 - 15 ngày) 70% lượng phân đạm, 50% lượng phân kali ; thúc lần 2 (sau khi gieo 25 - 30 ngày) 30% lượng phân đạm, 50% lượng phân kali; Bón thúc lần 3 khi cây ra hoa 50% lượng vôi còn lại.

Do đặc thù của vụ thu đông ở vùng Duyên hải Nam Trung bộ là nằm trong mùa mưa, cho nên lạc có xu thế phát triển sinh khối (sinh trưởng dinh dưỡng mạnh), làm ảnh hưởng đến quá trình tập trung dinh dưỡng cho quả, hạt; dẫn đến năng suất và chất lượng suy giảm.

Để hạn chế tình trạng này, dùng hoạt chất paclobutazol (Chế