

30cm/hom: mỗi hom có 2 đến 4 mắt mầm.


d. Cách trồng:

Trồng hom đơn (mỗi hố một hom), đặt hom theo lòng rãnh, hom cách hom 25cm, lấp đất dày 7-10cm.



e. Chăm sóc:

Sau khi trồng 15-20 ngày mầm cỏ bắt đầu nhô lên khỏi mặt đất, trồng dặm những hom đã bị chết, làm cỏ dại xới váng. Khi cỏ lên cao 50-60cm tiến hành làm cỏ dại lần hai.



f. Thu hoạch và sử dụng:

Sau 75 ngày trồng có thể thu hoạch lúa đầu tiên (Tuyệt đối không thu hoạch lần đầu khi cỏ còn non vì sẽ ảnh hưởng tới năng suất sau này) và các lứa tiếp theo cách 35-45 ngày có thể thu hoạch lại. Cắt cỏ cao cách gốc 5-6cm. Cắt sạch không để lại cây non để cỏ mọc đều.



Trồng một lần có thể sử dụng được 3-5 năm, mùa khô nếu tưới nước được thì vẫn cho thu hoạch tốt.

Năng suất xanh có thể đạt 220-400

tấn/ha/năm.

Ghi chú: Công thức phân bón như sau: (Tính cho 1 hecta)

- + Phân chuồng (phân bò được ủ hoai): 30 m³/ha
 - + Vôi bột: 500 kg/ha
 - + Phân lân: 300 kg/ha
 - + Phân Kali: 250 kg/ha
 - + Phân Urê: 350 kg/ha
- Cách bón phân vôi bón khi cày, bữa lần cuối cùng; phân chuồng, lân chỉ bón một lần trước khi trồng còn phân Kali và Urê bón sau khi trồng 15 ngày và sau mỗi lứa cắt.



BQL KIỂM TRA MÔ HÌNH



BẮM CỎ VA06



NUÔI BÒ BẰNG CỎ TRỒNG



DỰ ÁN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ NÔNG NGHIỆP

2283-VIE(SF)

QUY TRÌNH KỸ THUẬT TRỒNG CỎ GHINÊ VÀ VA06 LÀM THỨC ĂN CHO BÒ



Tôn Thất Dạ Vũ – Viện KHKTNLN Tây Nguyên

A. CHUẨN BỊ VƯỜN TRỒNG CỎ

Tiến hành chặt bỏ hết tất cả các cây trong vườn đồng thời thu dọn sạch trong vườn để thuận lợi cho chăm sóc cỏ sau này và tạo điều kiện thuận lợi cỏ phát triển tốt nhất. Tiếp theo sử dụng những vật liệu sẵn có và rẻ tiền tại địa phương để làm hàng rào nhằm bảo quản vườn cỏ hạn chế tối đa các tác nhân gây ảnh hưởng đến năng suất của đồng cỏ.

B. KỸ THUẬT TRỒNG CỎ

1. Cỏ Ghinê (Panicum maximum TD58)

a. Thời vụ gieo trồng: Vào đầu mùa mưa, tháng 5, 6, 7 là tốt nhất.

b. Chuẩn bị đất: Cày bừa hoặc cuốc kỹ đất 2 lần, làm cỏ dại sạch, đánh đất cho tơi xốp và mịn, san bằng phẳng, rạch hàng sâu 10-15cm, hàng cách hàng 40cm.

c. Chuẩn bị giống:

Mỗi hecta cần 6-7 tấn gốc. Chuẩn bị giống như sau: cỏ trên đồng ruộng cắt bỏ phần ngọn, phần gốc còn lại cao khoảng 20-



30cm. Dùng cuốc đánh gốc cỏ lên, rũ sạch đất, cắt bớt rễ già, tách thành cụm 3-5 tép để trồng.

d. Cách trồng:

Hàng đã được rạch sẵn tiếp đến đặt cụm giống xuống rãnh, vun đất vào gốc dày khoảng 15cm dùng các đầu ngón tay đè đất xung quanh gốc thật chặt sau đó lấp tiếp đất vào dày khoảng 5-6cm và giẫm nhẹ.



e. Chăm sóc: Sau 15 - 20 ngày trồng dặm lại những cây chết, sau 30 ngày xới văng và làm cỏ dại. Mỗi lứa cắt nên kết hợp làm cỏ dại và bón thêm phân vô cơ. Vào mùa khô tưới thêm nước sau mỗi lứa cắt.

f. Thu hoạch và sử dụng: Lúa đầu thu hoạch lúc 60-90 ngày tuổi, các lứa sau cách 30-45 ngày. Dùng liềm cắt cách mặt đất 7-10cm. Cỏ thu hoạch cho bò ăn tươi, nếu quá nhiều thì có thể đem phơi khô để cắt hoặc ủ xanh cho gia súc ăn dần.

Cỏ trồng một lần sử dụng được trong



3-4 năm. Sau đó đánh gốc cày xới và trồng lại. Năng suất cỏ đạt: 130-180 tấn chất xanh/ha/năm, mỗi năm có thể cắt được 7-8 lứa.

Ghi chú: Công thức bón phân như sau: (tính cho 1 hecta)

+ Phân chuồng (phân bò được ủ hoai): 30m³/ha

+ Vôi bột: 500 kg/ha

+ Phân lân: 300 kg/ha

+ Phân Kali 250 kg/ha

+ Phân Urê: 350 kg/ha

Cách bón phân vôi bón khi cày, bừa lần cuối cùng; phân chuồng, lân chỉ bón một lần trước khi trồng còn phân Kali và Urê bón sau khi trồng 15 ngày và sau mỗi lứa cắt

2. Cỏ VA06 (Varisme)

a. Thời vụ gieo trồng: Đầu mùa mưa, tốt nhất vào tháng 5, 6, 7 là tốt nhất.

b. Chuẩn bị đất:

Cày bừa hoặc cuốc kỹ đất 2 lần, làm cỏ dại sạch, đánh đất cho tơi xốp và mịn, san bằng phẳng, rạch hàng sâu 15-20cm và hàng cách hàng 40cm.

c. Giống: Trồng bằng hom, dùng thân cỏ có tuổi từ 80-100 ngày tuổi chặt vát dài 25-

